

Gebrauchsinformation – bitte sorgfältig lesen!



Kräuterblut®

Floradix® Eisen-Folsäure-Dragees

Traditionelles Arzneimittel.

Anwendungsgebiete:

Traditionell angewendet zur Besserung des Allgemeinbefindens.

Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Gegenanzeigen:

Sie dürfen Floradix Eisen-Folsäure-Dragees nicht anwenden, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie auf einen der Inhaltsstoffe überempfindlich reagiert haben.

Eisenhaltige Wirkstoffkombinationen dürfen nicht eingenommen werden:

- bei der selten vorkommenden Eisenspeicherkrankheit (Hämochromatose)
- bei der Thalassämie, auch Mittelmeeranämie genannt, der eine Fehlproduktion der roten Blutkörperchen zugrunde liegt.
- bei Eisenüberladung aufgrund von Anämien (Infektions- oder Tumoranämie), ausgelöst durch einen Infekt oder Tumor.
- bei Eisenverwertungsstörungen wie z.B. bei der sideroachrestischen Anämie.

Dieses Arzneimittel ist aufgrund der enthaltenen Lactose ungeeignet für Personen mit Galactose-Unverträglichkeit (hereditäre Galactoseintoleranz), Lactose-Intoleranz aufgrund Lactase-Insuffizienz und Glucose-Galactose-Malabsorption.

Dieses Arzneimittel ist wegen seines Gehaltes an Sucrose (Zucker) ungeeignet für Patienten mit der selten vorkommenden, ererbten Fructose-Unverträglichkeit (hereditäre Fructose-Intoleranz), einer Glucose-Galactose-Malabsorption oder einem Saccharase-Isomaltase-Mangel.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Beim Auftreten von Krankheitszeichen, sowie unklaren oder andauernden Beschwerden, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

- Eisensalze verringern die Resorption von Tetracyclinen, Penicillamin, Goldverbindungen, Levodopa und Methyl-dopa.
- Eisensalze beeinflussen die Resorption von Chinolon-Antibiotika (z.B. Ciprofloxazin, Levofloxazin, Norfloxazin, Ofloxazin)
- Eisensalze vermindern die Resorption von Thyroxin bei Patienten die eine Substitutionstherapie mit Thyroxin erhalten.
- Die Resorption von Eisen wird durch gleichzeitige Anwendung von Cholestyramin, Antacida (Ca++, Mg++, Al+++ -Salze) sowie Calcium- und Magnesium-Ergänzungspräparaten herabgesetzt.
- Die gleichzeitige Einnahme von Eisensalzen mit Salicylaten oder nichtsteroidalen Antirheumatika kann die Reizwirkung des Eisens auf die Schleimhaut des Magen-Darm-Traktes verstärken.
- Eisenbindende Substanzen wie Phosphate, Pyruvate oder Oxalate sowie Milch, Kaffee und schwarzer Tee hemmen die Eisenresorption.

Floradix Eisen-Folsäure-Dragees sollten 2–3 Stunden nach Verabreichung einer der oben genannten Substanzen eingenommen werden.

Warnhinweise:

Keine bekannt.

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, 2-mal täglich eine überzogene Tablette (Dragee) vor dem Essen unzerkaut mit etwas Flüssigkeit einnehmen.

Ein Dragee enthält ca. 4,5 mg 2-wertiges Eisen

Zwei Dragees entsprechen 0,3 BE

Dauer der Anwendung:

Unbegrenzt.

Nebenwirkungen:

Wie bei allen eisenhaltigen Arzneimitteln kann nach Einnahme von Floradix Eisen-Folsäure-Dragees eine völlig

harmlose Dunkelfärbung des Stuhls auftreten.

Sollten Sie weitere Nebenwirkungen beobachten, so teilen Sie diese Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweis:

In der Originalpackung und nicht über 25 °C lagern.

Dieses Arzneimittel ist nach Ablauf des auf dem Blister und der äußeren Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr anzuwenden.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Zusammensetzung:

Eine überzogene Tablette (Dragee) enthält:
als Wirkstoffe:

Eisen(II)-D-gluconat (Ph. Eur.)	40,0 mg
Nicotinamid	10,0 mg
Riboflavin	1,5 mg
Thiaminchloridhydrochlorid	0,5 mg
Folsäure	0,4 mg

Sonstige Bestandteile:

Trockenextrakt (5-7:1) aus einer Mischung von Brennnesselkraut, Queckenwurzelstock, Weißdornblätter mit Blüten, Tausendgüldenkraut, Rotalgenhallus, Spinatblätter (3:2:2:1:4:8), Auszugsmittel: Ethanol 30 % (V/V); Ascorbinsäure; Trockenextrakt aus Hagebutten (1,5–1,9:1), Auszugsmittel: Wasser; Lactose-Monohydrat; Maltodextrin; gefälltes Siliciumdioxid; Croscarmellose-Natrium; Calciumstearat; Schellack; Sucrose (Saccharose); Talkum; Calciumcarbonat; weißer Ton; Macrogol 6000; Titandioxid E 171; Eisenoxid E 172

Darreichungsform und Inhalt:

Originalpackungen mit 84 und 140 überzogenen Tabletten (Dragees)

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

SALUS Haus GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 24, 83052 Bruckmühl

Fassung der Packungsbeilage: August 2010

Eigenschaften:

Floradix Eisen-Folsäure-Dragees enthalten eine sehr gut aufnehmbare organische Eisenverbindung (Eisen(II)-gluconat), B-Vitamine und Folsäure.

Außerdem enthalten Floradix Eisen-Folsäure-Dragees Kräuterextrakte aus Spinat und Queckenwurzel, einen spurenelementreichen Meeresalgenextrakt und Vitamin-C-haltige Hagebutten- und Brennnesselextrakte.

Weitere Angaben

Bei allen Altersstufen und Bevölkerungsgruppen wird immer häufiger Eisenmangel festgestellt, wodurch das Allgemeinbefinden beeinträchtigt werden kann.

Besonders betroffen: Frauen und Mädchen

Nahezu jedes zweite Mädchen und jede Frau müssen heute mit Eisenmangel rechnen. Die Gründe hierfür sind Regelblutungen und in ganz besonderem Maße Schwangerschaften sowie Stillzeiten, die den vorhandenen Eisen-vorrat reduzieren.

Kinder und Jugendliche brauchen viel Eisen!

Im Wachstumsalter wird besonders viel Eisen für den Aufbau von Blutfarbstoff und das Wachstum der Körperzellen benötigt. Eisenmangel kann außerdem – besonders im Kindesalter verantwortlich sein für eine verstärkte Anfälligkeit gegenüber banalen Infekten. Schützen Sie Ihr Kind wirksam vor Eisenmangel mit Floradix Eisen-Folsäure-Dragees.

Vitalität im Alter

Zum Eisendefizit in der Nahrung kann bei älteren Menschen auch noch die normale Eisenaufnahme durch den Darm vermindert sein: Man sollte es nicht dazu kommen lassen, dass man sich infolge Eisenmangels lustlos und müde fühlt. Dazu kann sich dann noch Appetitmangel einstellen oder gar Kopfschmerzen. Floradix Eisen-Folsäure-Dragees beugen segensreich vor.

SALUS Haus GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 24
83052 Bruckmühl